



ISSN 1561-4212
июнь, 2015 г.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ■ ФЫЛЫМЫ ЖУРНАЛ

Д. Серікбаев
атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық
университетінің

ХАБАРШЫСЫ

ВЕСТНИК

Восточно-Казахстанского
государственного технического
университета
имени
Д. Серикбаева

2

Регистрационный № 145-ж

№ 2 (68), июнь, 2015

Основан в 1998 году

Выходит 4 раза в год

Ғылыми журнал

Д. Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық
университетінің

ХАБАРШЫСЫ



ВЕСТНИК

Восточно-Казахстанского государственного
технического университета
им. Д. Серикбаева

Научный журнал



Бас редакторы - Главный редактор

Ж.К. Шаймарданов

ректор, профессор

Редакция алқасы - Редакционная коллегия:

Заместители главного редактора:

Ж.О. Кульсентов, д-р техн. н., проф.,

О.Д. Гавриленко, канд. геол.-мин. н.

Ответственный секретарь - О.Н. Николаенко

Члены коллегии:

А.К. Адрышев, д-р техн. н., проф.,

А.Н. Алексеенко, д-р ист. н., проф.,

Д.Л. Алонцева, канд. физ.-мат. наук, проф.,

Ю.В. Баталов, д-р экон.н., проф.,

Ю.А. Веригин, д-р техн. н., проф.,

Б.А. Дьячков, д-р геол.-мин. н., проф.,

М.В. Дудкин, д-р техн. наук, проф..

А.В. Егорина, д-р геог. наук, проф.,

С.А. Жуманазар, канд. экон. наук, доц..

Т.Т. Ипалаков, д-р техн. н., проф.,

А.И. Квасов, д-р техн. н., проф.,

Е.А. Колос, д-р экон. наук, доц.,

В.П. Колпакова, д-р техн. наук, доц.,

В.Х. Кумыков, д-р техн. н., проф.,

Н.П. Малышев, канд. экон. н., проф.,

О.А. Манцуров, подполковник,

Ж.Д. Назбиеев, д-р. филол. н., проф.,

С.В. Плотников, д-р физ.-мат. н., проф.,

А.Д. Погребняк, д-р физ.-мат. наук, проф.,

М.К. Скаков, д-р физ.-мат. н., проф.,

Б.В. Сырнев, д-р техн. н., проф.,

А.К. Томилин, д-р физ.-мат. н., проф.,

Е.М. Турганбаев, канд. физ.-мат. н., Dr. PhD.,

С.Д. Тыныбекова, д-р пед. н., проф.

Н.Г. Хисамиев, д-р физ.-мат. н., проф..

В.Ю. Чернавин, канд. техн. н, проф.,

Ю.Н. Шапошник, д-р техн. н., проф.

ISSN 1561- 4212

© Восточно-Казахстанский
государственный технический
университет им. Д. Серикбаева,
2015

- user student – белгілі бір білім беру бағдарламасы бойынша жоғары не жоғарыдан кейінгі білім алу мақсатымен тәртіп бойынша оқу орнына тіркелген тұлға;
- user parent – баланың оқудағы жетістіктерін кадағалайтын анасы, әкесі немесе күтүші;
- user abiturient – жоғары оқу орнына түсуге иштей білдіретін қолданушы;
- user adviser – белгілі бір мамандық бойынша академиялық кеңесші рөлін атқарушы;
- user librarian – электронды университеттің кітапханасында қызмет көрсету бойынша қолданушы;
- user admin – желілік білім беру платформасында қызмет көрсететін қолданушы.

Ұсынылып отырған онтологиялық ресурстар базасы жоғары оқу орнының облысында деректерді сактауга, өзгертуге, бағалауга және толықтыруға мүмкіндік береді.

Аталған жұмыста құрастырылған онтологиялық база ЖОО білім беру үрдісін басқаруға арналған. Құрастырылған онтология объектілердің сипаттамасын анықтауга және модельдеуге мүмкіндік береді. Аталған көрсеткіштерді білім беру үрдісін қолдануды қанағаттандыру үшін қолдана отырып, өзгерістер жасауга мүмкіндік туады. Бұл әдіс ЖОО негізгі есептерін шешу үшін ақпараттық базаны толықтай құрылымдауга көмектеседі.

Әдебиеттер

1. Крюков В.В. Корпоративная информационная среда вуза: методология, модели, решения / В.В. Крюков, К.И. Шахгельдян. – Владивосток: Дальнаука, 2007. – 308 с
2. СТ РК ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
3. Соловьев В.Д. Онтологии и тезаурусы: Учеб. пособие / В.Д. Соловьев, Б.В. Добров, В.В. Иванов, Н.В. Лукашевич. – Казань, Москва: Казанский государственный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006.

Получено 14.05.2015

УДК 631.82; 631.171

С.О. Нукешев, Д.З. Есхожин, Е.С. Ахметов, К.Д. Есхожин, Е.А. Золотухин
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Астана

Г.И. Личман

Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства, г. Москва

Н.Н. Романюк

Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ДОЗ УДОБРЕНИЙ

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от множества переменных факторов. К ним относятся показатели плодородия обрабатываемого сельскохозяйственного участка, культура земледелия с агрономической точки зрения, а также оснащенность и инновационный уровень технических средств, осуществляющих технологические операции по возделыванию и уборке урожая. Однако поддержание и приумножение плодородия сельскохозяйственного угодия невозможно без своевременного внесения в почву в оптимальных дозах минеральных удобрений. Причем оптимальная доза внесения должна учитывать широкую вариабельность наличия питательных веществ на элементарных участках поля [1-3].

Расчет доз вносимых в почву удобрений проводят несколькими методами. В настоящее время на практике программирования урожая наиболее распространенными являются два принципиальных подхода к расчету доз удобрений:

1) метод, основанный на учете баланса использования растениями питательных веществ из почвы и удобрений;

2) метод, основанный на статистическом анализе многолетних экспериментальных данных полевых агрохимических опытов с удобрениями.

Расчеты доз удобрений основаны на следующих данных:

- вынос питательных веществ на единицу основной продукции удобряемой культуры при соответствующем количестве побочной продукции (соломы, ботвы и т. д.);

- коэффициенты использования удобряемой культурой элементов питания из минеральных удобрений;

- данные агрохимической лаборатории о содержании элементов питания в почве (картограммы);

- фактический урожай с данного поля (ср. за последние 3-5 лет);

- программируемый урожай.

Широкое распространение получил балансовый метод, предложенный И.С. Шатиловым и М.К. Каюмовым, так как он дает более надежные результаты и не требует больших статистических данных, [4]. По этому методу доза минерального удобрения определяется по каждому питательному элементу: учитывается вынос данного элемента урожаем растений, коэффициент использования элемента питания из удобрений, содержание его в почве и коэффициент использования этого элемента растением из почвы по формуле

$$D = (100 \cdot B - P \cdot K_p) / K_u, \quad (1)$$

где D – доза минерального удобрения, кг/га д.в.; B=U·K – вынос элемента питания программируемым урожаем, кг/га д.в.; U – программируемый урожай зерна, ц/га; K – вынос калия (азота или фосфора) единицей (1 ц) основной и побочной продукции, кг; K_p, K_u – коэффициенты использования питательного элемента из почвы и из удобрений, %; P – содержание в почве доступного питательного элемента, кг/га.

Содержание доступного элемента рассчитывают по формуле

$$P = n \cdot d \cdot h, \quad (2)$$

где n – содержание доступного для растений элемента, мг/100 г почвы; d – объемная масса почвы, г/куб. см; h – пахотный слой почвы, см.

Дозу вносимого минерального удобрения также можно рассчитать с учетом содержания питательных веществ:

$$D = (100 \cdot B - P \cdot K_p K_u) / C, \quad (3)$$

где C – содержание питательных веществ удобрений, %.

В случае отсутствия в хозяйстве картограмм, расчет дозы удобрений можно провести по планируемой прибавке урожая по формуле

$$D = 100 \cdot B_p / K_u \cdot C, \quad (4)$$

где B_p – вынос элемента питания прибавкой урожая.

Расчетные дозы, выраженные в действующем веществе, надо перевести в тонны, т.е. рассчитать общее количество удобрения. Для этого величину, характеризующую необходимое количество питательного элемента, следует разделить на процент его содержания в минеральном удобрении и умножить на 100:

$$D_{\text{уточн}} = (D/C) \cdot 100, \quad (5)$$

где $D_{\text{уточн}}$ – необходимое количество удобрения в граммах; D – количество требуемого элемента в граммах действующего вещества; C – процентное содержание элемента в удобрении (указано на упаковке).

Процентные значения (D_N , D_P , D_K) обрабатываются, затем определяется марка тукосмеси N:P:K и норма ее внесения на 1 га.

Рассмотренный балансовый метод не лишен недостатков, так как требует оптимальных значений показателей, включенных в формулу. Тем не менее, он позволяет с достаточной долей точности рассчитать дозу удобрения под планируемый урожай. Практическое использование статистического метода ограничено необходимостью сбора многолетних экспериментальных данных.

Рассмотрим математическую модель расчета доз одинарных удобрений. Для оценки влияния наличия питательных элементов в почве и качества их распределения на урожайность сельскохозяйственных культур, определения доз внесения следует использовать функции отзывчивости сельскохозяйственных культур на возрастающие дозы удобрений. Наибольшее распространение в настоящее время получили функции отзывчивости вида [2]:

$$Y = a_0 + a_1 D + a_2 D^2 \left(\frac{Q_{\text{дв}}^2}{10^4} + 1 \right), \quad (6)$$

где Y – функция отзывчивости с-х культуры на дозы удобрения; D – доза внесения, кг/га; $Q_{\text{дв}}$ – коэффициент вариации питательных элементов по поверхности поля, %; a_0 , a_1 , a_2 – эмпирические коэффициенты.

Для исследования отзывчивости пшеницы на дозу внесения удобрения и на равномерность его распределения в почве изучим график зависимости ее урожайности от приведенных переменных факторов. Анализ графика показывает, что урожайность пшеницы, соответственно эффективность удобрения зависит как от средней дозы D, так и от неравномерности распределения $Q_{\text{дв}}$. Так, с увеличением дозы внесения до 120 кг/га, при неравномерности распределения до 20 %, урожай увеличивается от 20,0 до 24,6 ц/га. А при неравномерностях 40 и более процентов повышение дозы свыше 80 кг/га не повышает, а снижает общий урожай (рис. 1).




Рисунок 1 - Отзывчивость пшеницы на возрастающие дозы удобрения при различных значениях его распределения

Для определения максимальной урожайности Y_{max} необходимо продифференцировать выражение (6) по D и приравнять полученную производную нулю. Разрешив полученное выражение относительно D , находим оптимальную дозу для различных значений неравномерности распределения питательных элементов в почве:

$$D_{Y_{max}} = -\frac{5 \cdot 10^3 \cdot a_1}{a_2(Q_{de} + 10^4)}. \quad (7)$$

Подставив значение оптимальной дозы (7) в (6), получим выражение для нахождения максимальной урожайности:

$$Y_{max} = a_0 - \frac{2.5 \cdot 10^3 \cdot a_1^2}{a_2(Q_{de}^2 + 10^8)}. \quad (8)$$

Используя выражения (7) и (8) в каждом конкретном случае, в зависимости от наличия питательных элементов в почве и качества их распределения, можно определять дозу внесения удобрений и качество их распределения, необходимые для получения запrogramмированного урожая и максимальной окупаемости удобрений.

Рассмотрим математическую модель расчета доз комплексных удобрений. При дифференцированном внесении комплексных - двойных (азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные) или тройных (азотно-фосфорно-калийные) удобрений, возникают сложности с обоснованием оптимальных доз по элементам [5-7]. При этом, для получения планируемой урожайности вариабельность параметров плодородия почвы (наличия доступных для растений NPK в почве) необходимо учесть по действующему веществу на i -м участке поля: азота – D_{Ni} , фосфора – D_{Pi} и калия – D_{Ki} , соответственно. Дозы по физической массе для каждого элемента питания NPK рассчитывают по формулам

$$D_{mNi} = \frac{D_{Ni}}{k_N}; D_{mPi} = \frac{D_{Pi}}{k_P}; D_{mKi} = \frac{D_{Ki}}{k_K}. \quad (9)$$

Здесь k_N , k_P , k_K – коэффициенты, характеризующие содержание соответствующего элемента в удобрениях в долях единицы. Например, в аммофосе, который выпускается в виде двух марок - А и Б, содержит 9-11 % N и 42-50 % P_2O_5 , т. е. $k_N=0,09\dots 0,11$, $k_P=0,42\dots 0,5$.

Дифференциацию дозы внесений комплексного удобрения можно осуществлять таким образом, чтобы один из элементов, например N, вносился в соответствии с электронной картой. При этом доза по физической массе для i -го участка поля будет равна D_{mNi} . Тогда два других элемента P и K будут вноситься с дозами $k_P (D_{Ni}/k_N)$ и $k_K (D_{Ni}/k_N)$, которые не будут соответствовать дозам, необходимым для обеспечения потребности растений в этих элементах. В связи с этим возникает задача определения с какой дозой D_m необходимо вносить удобрения, чтобы урожай Y на конкретном поле был максимальным.

В случае, когда известна функция отзывчивости с-х культуры, например яровой пшеницы на азот, фосфор и калий при их совместном внесении, ее можно представить в виде уравнения:

$$Y = f(N, P, K). \quad (10)$$

Уравнение (10) может быть представлено в разном виде и зависит от культуры, природно-климатических условий и др.

Урожайность Y_i (кг/га) на i -м участке поля может быть рассчитана по формуле

$$\begin{aligned} Y_i &= f_i(D_{Nii} + D_{Ni}; D_{Pii} + D_{Pi}; D_{Kii} + D_{Ki}); \\ Y_i &= f_i(D_{Nii} + k_N D_{mi}; D_{Pii} + k_P D_{mi}; D_{Kii} + k_K D_{mi}). \end{aligned} \quad (11)$$

Здесь D_{Nii} , D_{Pii} , D_{Kii} – дозы соответствующего элемента питания в почве, доступные для растения, кг/га; D_{mi} – доза i -го элемента (NPK) для i -го участка, при которых урожай на поле будет максимальным; k_N , k_P , k_K – коэффициенты, характеризующие содержание NPK в удобрении.

Величины $D_{N_{\text{mi}}}$, $D_{P_{\text{mi}}}$, $D_{K_{\text{mi}}}$ определяются на основе данных обследования поля, которые могут быть представлены в виде таблиц или электронных карт.

В (11) нужно найти такие значения D_{mi} (кг/га), при которых урожай на рассматриваемом поле будет максимальным при внесении заданного количества M (кг) удобрения с содержанием NPK, характеризуемого коэффициентами k_N , k_P , k_K , соответственно.

При этом целевую функцию можно представить в следующем виде:

$$Y = \sum f_i(D_{N_{\text{mi}}} + k_N D_{\text{mi}}; D_{P_{\text{mi}}} + k_P D_{\text{mi}}; D_{K_{\text{mi}}} + k_K D_{\text{mi}}) s_i \Rightarrow \max. \quad (12)$$

Здесь s_i – площадь элементарного участка поля, га.

Когда поле разбито на участки, равные по площади, выражение (12) примет следующий вид:

$$Y = S \sum f_i(D_{N_{\text{mi}}} + k_N D_{\text{mi}}; D_{P_{\text{mi}}} + k_P D_{\text{mi}}; D_{K_{\text{mi}}} + k_K D_{\text{mi}}) \Rightarrow \max, \quad (13)$$

$S = \sum s_i$ – площадь поля, га.

Если к (13) прибавить ограничение, получим постановку задачи в математической форме:

$$\begin{cases} \text{определить} \\ \max S \sum f_i(D_{N_{\text{mi}}} + k_N D_{\text{mi}}; D_{P_{\text{mi}}} + k_P D_{\text{mi}}; D_{K_{\text{mi}}} + k_K D_{\text{mi}}) \\ \text{при ограничении} \\ \sum D_{\text{mi}} = M. \end{cases} \quad (14)$$

Постановку задачи можно сформулировать в другом виде. Например, необходимо получить выход продукции на конкретном поле не менее запланированного урожая $Y_{\text{пл}}$. Требуется определить минимальное количество удобрения данного вида, которое необходимо внести на данное поле. В этом случае постановка задачи имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \text{определить} \\ \min \sum D_{\text{mi}} \\ \text{при ограничении} \\ Y_{\text{пл}} \leq S \sum f_i(D_{N_{\text{mi}}} + k_N D_{\text{mi}}; D_{P_{\text{mi}}} + k_P D_{\text{mi}}; D_{K_{\text{mi}}} + k_K D_{\text{mi}}). \end{cases} \quad (15)$$

Рассмотрим пример применения вышеприведенного алгоритма на поле, разбитом на 6 участков, площадью 1 га. Известно содержание питательных элементов NPK в почве на каждом из участков N_{mi} , P_{mi} , K_{mi} (мг/100 г), коэффициенты использования NPK из почвы ($K_{N_{\text{mi}}}$, $K_{P_{\text{mi}}}$, $K_{K_{\text{mi}}}$), коэффициенты использования питательных веществ в год их применения (K_{Ny} , K_{Py} , K_{Ky}). При известных выше величинах функция отзывчивости пшеницы представится в виде уравнения регрессии [6]. Она отражает закономерность действия удобрений на урожайность данной культуры Y (кг/га):

$$y = 17,0 + 3,26 \cdot N^{0,5} - 1,237 \cdot N + 11,331 \cdot P^{0,5} - 2,085 \cdot P + 0,650 \cdot (N \cdot P)^{0,5} + 0,864 \cdot (P \cdot K)^{0,5}. \quad (16)$$

В (16) NPK показывает дозу азотных, фосфорных и калийных удобрений в условных единицах с учетом наличия питательных элементов в пахотном слое:

$$N = D_N / 25, P = D_P / 25, K = D_K / 25.$$

Дозы D_N , D_P , D_K представляют собой сумму питательных веществ NPK, находящихся в почве $D_{N_{\text{mi}}}$, $D_{P_{\text{mi}}}$, $D_{K_{\text{mi}}}$ (кг/га) и вносимых с удобрениями D_{Ny} , D_{Py} , D_{Ky} (кг/га).

Значения $D_{N_{\text{mi}}}$, $D_{P_{\text{mi}}}$, $D_{K_{\text{mi}}}$, D_{Ny} , D_{Py} , D_{Ky} рассчитываются по формулам

$$D_{N_{\text{mi}}} = N_{\text{mi}} K_m K_{N_{\text{mi}}}; D_{P_{\text{mi}}} = P_{\text{mi}} K_m K_{P_{\text{mi}}}; D_{K_{\text{mi}}} = K_{\text{mi}} K_m K_{K_{\text{mi}}}; \quad (17)$$

$$D_{Ny} = D_m k_N K_y; D_{Py} = D_m k_P K_y; D_{Ky} = D_m k_K K_y, \quad (18)$$

где K_m – коэффициент перевода питательного вещества почвы из мг/100 г в кг/га.

Решение задачи выполнено методом Лагранжа.

Рассчитан нитроаммофос с общим содержанием питательных веществ (N, P и K) 51 % марки <А> (в марках <А> - NPK по 17 % и в <Б> - по 13; 19 и 19 %). Питательные элементы, не только азот и калий, но и фосфор, содержатся в водорастворимой форме и легкодоступны растениям. Эффективность нитроаммофосок такая же, как смеси простых водорастворимых удобрений. Принятые данные для проведения расчетов представлены в табл. 1.

Функцию отзывчивости (16) и значения принятых величин в табл. 1 представим в (11). В результате получим целевую функцию. В качестве ограничения принято количество удобрений M (кг), которое на данном почвенно-климатическом фоне дает потенциально возможный урожай. В результате решения задачи были определены оптимальные значения доз D_{mi} удобрений по физической массе для каждого участка при заданном количестве удобрений M , при которых урожай с поля максимальный. Результаты расчета доз внесения минеральных удобрений и полученный урожай приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 1

Данные для проведения расчетов

Номер участка, п	Коэффициенты, характеризующие содержание NPK в удобрении			Содержание NPK в пахотном слое участков, кг/га		
	k_N	k_P	k_K	N_{ni}	P_{ni}	K_{ni}
1	2	3	4	5	6	7
1	0,17	0,17	0,17	35	200	246
1	2	3	4	5	6	7
2	0,17	0,17	0,17	76	427	769
3	0,17	0,17	0,17	198	746	181
4	0,17	0,17	0,17	95	980	635
5	0,17	0,17	0,17	58	1248	388
6	0,17	0,17	0,17	126	350	805

Таблица 2

Оптимальные дозы D_{mi} и урожая при дифференцированном внесении заданного количества удобрений M

Количество вносимых удобрений, M кг	Доза внесения физической массы на i -й участок, кг/га						Урожай, Y , т
	D_{m1}	D_{m2}	D_{m3}	D_{m4}	D_{m5}	D_{m6}	
1000	445	175	0	55	188	137	12,13
2000	673	366	122	188	310	341	12,79
3000	884	549	267	320	438	543	13,33

Полевые опыты по плану внесения «Селитры-Аммиачная» марки Б ГОСТ 2-85 на посеве ячменя сорта «Арна» показали его стабильную урожайность. Суммарный урожай с шести участков по 1 га каждый составил в среднем 12,75 т при коэффициенте вариации 4,7 (табл. 2). Из нее и рис. 2 также видно, что при любом количестве ограничений внесения удобрений на третий участок необходимо вносить минимальную дозу. А при ограничении 1000 кг, вовсе не нужно вносить удобрения. Это говорит о том, что данный участок имеет естественное высокое плодородие. Также необходимо отметить, что при любой пестроте вносимых доз, дифференцированное внесение минеральных удобрений гарантирует стабильный урожай.




Рисунок 2 - Оптимальные дозы минеральных удобрений при дифференцированном внесении заданного количества

Разработанная математическая модель позволяет проводить расчеты оптимальных доз внесения одинарных и комплексных удобрений при наличии данных о вариабельности параметров плодородия почвы и соответствующих функций отзывчивости. Такие расчеты способствуют экономии минеральных удобрений, повышению их отдачи на урожай и снижению экологической нагрузки на окружающую среду. Модель может быть использована также при обосновании рациональных границ и эффективного объема применения дифференцированного способа внесения удобрений. Математическая модель может быть использована и при разработке методики оценки экономической эффективности дифференцированного внесения удобрений и внесения их с одной дозой для всего поля.

Математическая модель позволяет на основе функций отзывчивости растений на удобрения рассчитывать оптимальные дозы как при внесении удобрений с одной дозой для всего поля, так и дифференцированных доз с учетом вариабельности параметров плодородия поля.

Список литературы

- Нукешев С.О. Научные основы внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений в системе точного земледелия. - Астана, 2011. - 358 с.
- Nukeshov S.O., Lichman G.I., Marchenko N.M. Substantiation of requirements to quality of application of mineral fertilizers In system of PRECISION agriculture // S.Seifullin Kazakh Agro Technical Universitu Science Review. - Astana, 2007. - Vol. I (1). - P. 59-67.
- Ескожин Д.Э. Механизация минимальной и влагосберегающей обработки почвы в зоне Северного Казахстана. - Астана, 2009. - 220 с.
- Кажимов М.К. Научные основы програмирования урожая сельскохозяйственных культур / М.К. Кажимов, И.С. Шатилов. - М.: Колас, 1978. - 335 с.
- Измайлова А.Ю. Точное земледелие, проблемы и пути решения / А.Ю. Измайлова, Г.И. Личман, Н.М. Марченко // Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2010. - № 5. - С. 9-14.
- Нукешев С.О. Технологические и технические решения проблемы дифференцированного внесения туков в условиях рискованного земледелия // Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК: Доклады Междунар. науч.-практ. конф. на 22-й Межд. специализир. выст. «Белагро-2012». - Минск: БГАТУ, 2013. - С. 64-70.

7. Есхожин Д.З. Өздігінен тазаланатын себүші тазалатыны параметр лерінің теориялық және эксперименттік байланыстары / Д.З. Есхожин, Е.С. Ахметов, С.О. Нукешев // Вестник ПГУ им. С. Торайғырова. - 2014. - № 2. - Павлодар, 2014. - С. 92-100.

Получено 2.06.2015

УДК 658.512:005

С.Б. Раҳметулаева

Новый Экономический Университет им. Т. Рыскулова, г. Алматы

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА**

В настоящее время динамичность окружающей среды и ее влияние на экономическую деятельность компаний требует постоянного совершенствования систем управления внешними и внутренними агентами организации, которые формируют информационное поле вокруг компании. К внешним информационным агентам можно отнести партнеров компании, посредников, различные государственные органы, а также потребителей услуг либо товаров вашей организации [1]. Если организация размещает акции и облигации на рынке ценных бумаг, то круг внешних агентов существенно расширяется. Так информация о вашей компании становится более прозрачной и открытой для широкой аудитории, которая постоянно осуществляет мониторинг и оценку всех данных, находящихся в открытом доступе, касательно вашей компании. К внутренним агентам можно отнести персонал компании, учредителей либо акционеров, также если необходимо вовлекать финансовые институты, то и банки, и страховые организации, либо рейтинговые агентства могут стать носителями и потенциальными источниками передачи определенной конфиденциальной информации о вашей деятельности.

В настоящее время информация - это мощный инструмент, который может как повысить стоимость компании, так и привести к ее разорению. Эти риски относятся к категории reputационных рисков [2], так как неверная информация о вашей компании может привести к недоверию со стороны партнеров, клиентов, акционеров, кредиторов, поставщиков и сотрудников. То есть построение механизма мониторинга информации вокруг деятельности компании является актуальной и недостаточно изученной темой как в научном сообществе, так и в практической деятельности.

Глобальная сеть Internet, электронные СМИ, корпоративные и социальные сети, различные базы данных, в которых присутствуют сведения о компании, определили потребность в создании алгоритма участия и анализа информационного поля, сформированного вокруг компании, в целях повышения ее эффективности, рентабельности и минимизации reputационного риска.

Следует отметить, что вышеперечисленные источники данных могут содержать как важные для компании сведения, так и другую информацию, другие факты, являющиеся нерепрезентативными (несущественными) для искомой компании. Все это затрудняет выбор данных, имеющих практическое (ценное) значение для деятельности компании.

Кроме того, в связи с развитием социальных сетей и сайтов в последние годы особый вид данных и информации появляется в виде различных отзывов и постов. Эти отзывы, мнения о деятельности компаний и об их продуктах порождаются клиентами, партнерами, покупателями товаров компаний и, возможно, конкурентами в целях осуществления
